

REPUBLIQUE DU NIGER
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ÉLEVAGE
SÉCRÉARIAT GÉNÉRAL
DIRECTION DES STATISTIQUES

BULLETIN DECADAIRES

Mois d'Août 2026
2ème Décade

«Régularité des précipitations au cours de cette décade dans certaines régions, cependant de très faibles précipitations et des longues pauses pluviométriques ont été observées dans d'autres localités avec perte des semis» «Début maturité du mil à Gaya et maturité du niébé à Gazaoua, Dungass, Gouré, Kantché et Magaria»
«Des cas infestations ont été signalées sur certaines cultures à divers stades de développement allant du tallage à la maturité»

«La situation pastorale est caractérisée par une installation généralisée de la campagne, au niveau de la bande Sud du pays et des retards dans certaines parties de la bande pastorale»

Synthèse Nationale

SOMMAIRE

- 1. Situation pluviométrique
- 2. Situation des semis
- 3. Situation Phénologique
- 4. Situation phytosanitaire
- 5. Cours des produits
- 6. Situation pastorale
- 7. Phénomènes exceptionnels

Zones Agricoles des régions de :
Agadez,
Diffa,
Dosso,
Maradi,
Tahoua,
Tillabéri,
Zinder et
Niamey

Introduction :

La deuxième décade du mois d'août 2026 a été caractérisée par une pluviométrie globalement régulière sur l'ensemble du pays. Toutefois, des pauses pluviométriques prolongées continuent d'être observées dans certaines localités, occasionnant des avortements de semis de mil. Sur le plan agricole, les semis de mil ont été réalisés dans 13 610 villages agricoles sur les 14 013 suivis, soit un taux de couverture de 97 %, contre 99 % à la même période en 2025. Le développement végétatif des cultures connaît une amélioration progressive. Un début de maturité du mil a été observé dans les départements de Gaya (région de Dosso). La floraison du sorgho a été observée dans le département de Tibiri (région de Dosso) et Illéla (Tahoua). Sur le plan phytosanitaire, malgré quelques infestations localisées de ravageurs, la situation demeure globalement maîtrisée grâce aux interventions réalisées. S'agissant des marchés, les prix des principales denrées alimentaires sont en légère hausse par rapport à la décade précédente, tout en affichant une baisse par rapport aux niveaux enregistrés à la même période de 2025. La situation pastorale est caractérisée d'une part par l'amélioration du couvert végétal et d'autre part la recharge des points d'eau de surface et de la nappe phréatique ainsi que l'écoulement des koris (Aderbissinat, Tchirozerine) dans la région d'Agadez. L'alimentation des animaux est assurée par l'herbe et le pâturage aérien en régénération et par la paille résiduelle dans les localités n'ayant pas reçu de pluies, comme le cas de certaines loca-

lités de la région d'Agadez. Les intrants zootechniques (son de blé, tourteaux de coton) viennent en complément. Les mouvements des animaux sont en général internes guidés par la recherche du pâturage vert et de l'eau. L'état d'embonpoint du bétail s'améliore progressivement au niveau des différentes localités du pays au fur et à mesure que le pâturage vert devient abondant. Les termes de l'échange sont dans l'ensemble en faveur des éleveurs.

1. Situation pluviométrique

Les précipitations enregistrées au cours de la deuxième décade du mois d'août ont varié de faibles à modérées voire fortes au niveau de certains postes pluviométriques. Les relevés pluviométriques varient de 1,4 mm en 1 jour à Namari au niveau de la commune urbaine de Diffa à 220 mm en 4 jours à Mafalia (Arrdt3/Ville de Maradi). Les cumuls pluviométriques décadaires les plus élevés enregistrés au niveau des autres postes pluviométriques se présentent, par région, comme suit : 51,1 mm en 2 jours à la DRA d'Agadez (région d'Agadez), 91 mm en 1 jour à Koulounfardou (Goudoumaria/région de Diffa), 147 mm en 4 jours à Gatawani (région de Dosso), 200 mm en 4 jours à Bourja (Arrdt3/Ville de Maradi), 140 mm en 3 jours enregistrés à Tabàye (Bouza/région de Tahoua), 148 mm en 2 jours à Bibiyergou (département de Tillabéri/région de Tillabéri), 197 mm en 4 jours à Dogoual Tsamia (Dépt Dungass/région de Zinder) et 81 mm en 2 jours à l'Arrondissement Communal Niamey IV. Le cumul pluviométrique saisonnier le

plus important enregistré depuis le début de la campagne a atteint 795 mm en 25 jours à Mafalia (Arrondissement 3/Ville de Maradi), contre 675,7 mm en 20 jours au niveau du poste pluviométrique de Korémairoua (Tibiri/ Dosso) à la même période de 2025. Quant au plus petit cumul, il est observé à Bosso (région de Diffa) avec 9,6 mm en 1 jour depuis le début de la saison.

2. Situation des semis

A la date du 20 août 2026, Le nombre de villages disposant de semis effectifs de mil est de 13 635 sur un total de 14 013 villages agricoles suivis soit un taux de couverture de 97 % sur le plan national contre 99 % sur les 13981 villages agricoles suivis à la même période en 2025. Au niveau régional, les opérations de semis sont entièrement achevées dans les régions de Dosso, Maradi, Tahoua, Zinder et Niamey, où les taux de réalisation ont atteint 100 %. Les régions d'Agadez (98 %) et de Tillabéri (95 %) affichent également des niveaux de couverture élevés. Cependant, il reste 378 villages sans semis : Agadez (11 villages), Diffa (242 villages) et Zinder (20 villages) Ce retard s'explique principalement par l'installation tardive mais surtout l'irrégularité des précipitations, qui ont compromis le démarrage de la campagne agricole.

3. Situation Phénologique :

Le développement végétatif des cultures se présentent comme suit :

- Mil : Les stades varient de la levée à la maturité. La montaison reste le stade dominant sur le plan national. Le stade le plus avancé est la maturité observée dans les départements de Gaya (région de Dosso).
- Sorgho : Les stades varient de la le-

vée à la floraison. La montaison reste le stade dominant sur le plan national. Le stade le plus avancé est la floraison observée dans le département de Tibiri (région de Dosso) et Illéla (Tahoua).
- Niébé : les stades varient de la levée à la maturité observée dans les départements de Gazaoua (région de Maradi), Dungass, Gouré, Kantché et Magaria (région de Zinder).
- Arachide : le développement végétatif de l'arachide varie de la levée à la formation des gousses observée dans les départements de Madarounfa, Gazaoua, Mayahi et Guidan Roumdji (région de Maradi) ; Dungass, Kantché, Takiéta et Magaria (région de Zinder) et Illéla (région de Tahoua).

S'agissant des autres cultures comme le Sésame, le voandzou, le gombo et l'oseille, leurs stades varient de la levée à la fructification par endroits. **La situation détaillée des stades de développement des principales cultures dont le mil, le sorgho, le niébé et l'arachide est présentée dans les tableaux n°2 et n°3.**

4. Situation phytosanitaire

La situation phytosanitaire de cette deuxième décade du mois d'août 2026 est caractérisée par des :

- Infestations de sautériaux (*Kraussaria angulifera*, *Oedaleus senegalensis*) sur 369,5 ha déclarés infestés sur mil, maïs et sorgho aux stades de levée avancée, tallage, montaison et floraison, dont 357,5 ha ont été traités dans les départements de Goudoumaria, Maïné Soroa, Dogondoutchi, Tchirozérine, Aderbissanat, Abalak, Illéla et la Communauté Urbaine de Niamey ;
- Infestations d'insectes floricoles (*Dysdercus volkeri*, *Rhyniptia infusca*, *Pachnoda interrupta*) sur 781 ha déclarés infestés sur mil et niébé aux stades

d'épiaison et floraison dont 726 ha dont été traités dans les départements de Gaya, Dogondoutchi, Kantché, Takiéta, Abala, Ballèyara, Illéla, Bagaroua, Guidan Roumdji, Aguié, Gazaoua et la ville de Tahoua ;

- Infestations de la chenille légionnaire d'automne (*Spodoptera frugiperda*) sur 10 ha déclarés infestés sur maïs, tous traités dans le département de Goudoumaria ;
- Infestations des chenilles (*Amsacta moloneyi*, *Antigastra catalaunalis*, *Noorda blitealis*) sur 251 ha de niébé, sésame, moringa, arachide et oignon aux stades début ramification, croissance et formation de gousses, dont 229 ha ont été traités dans les départements de Kantché, Magaria, Tchirozérine, Maïné Soroa, la ville de Maradi et la Communauté Urbaine de Niamey ;
- Infestations de pucerons (*Aphis cracivora*) sur 157 ha de niébé et cucurbitacées aux stades de croissance, début ramification et fructification, dont 147 ha ont été traités dans les départements de Maïné Soroa, Mayahi, Gazaoua, Ingall et Aderbissanat ;
- Infestations de criocères (*Lema planifrons*) sur 810 ha de mil aux stades de levée avancée, tallage et montaison, dont 635 ha ont été traités dans les départements de Madaoua, Dungass, Damagaram Takaya, Kantché, Takiéta, Mayahi, Dakoro, Guidan Roumdji et la ville de Zinder ;
- Infestations de la cicadelle (*Poophilus costalis*) sur 4 ha de mil dans le département de Takiéta ;
- Infestations de thrips (*Thrips tabaci*) sur 20 ha d'oignon au stade de croissance, tous traités dans le département de Tchirozérine ;
- Attaques d'oiseaux granivores

(*Quelea quelea*, *Passer luteus*) sur le mil au stade de grenaison dans les départements de Gaya, Falmey, Gazaoua, Konni, Abala, Tahoua, Illéla, Malbaza, Madaoua et la ville de Tahoua. Des prospections pour repérer les dortoirs des oiseaux sont en cours et des opérations de gardiennage au champ et d'effarouchement sont appliquées.

- Manifestations de la mineuse de l'épi du mil (*Heliocheilus albipunctella*) sur mil aux stades de floraison-maturité dans les départements de Kantché, Magaria, Dungass, Dakoro et Gazaoua.


Pour cette 2ème décade du mois d'août 2026, au total 2 402,5 ha ont été déclarés infestés et 2 124,5 ha ont été traités, soit un taux de couverture de 88,43%, avec 1 558,5 litres de pesticides ULV. Ainsi Du début de la campagne des cultures pluviales au 20 août 2026, 5 850,5 ha ont été déclarés infestés dont 5 353,5 ha ont été traités soit un taux de couverture de 91,50%.

5. Situation des prix des denrées alimentaires

Le niveau des prix des denrées alimentaires observé sur les marchés est en légère hausse comparée à la décade précédente et affiche une baisse comparée à la même décade de l'année 2025 de tous les produits. Les variations constatées sur les céréales sont : le riz (-10%) ; le maïs (-15%) ; le sorgho (-15%) et le mil (-7%)

Tableau n°2 : Cours des produits

REGIONS	Mil en F/Kg	Sorgho en F/Kg	Maïs en F/Kg	Riz en F/Kg	Niébé en F/Kg
AGADEZ	320	248	375	513	412
DIFFA	251	226	249	531	506
DOSSO	251	229	198	469	331
MARADI	221	183	188	494	342
TAHOUA	262	222	255	476	380
TILLABERI	300	250	239	512	469
ZINDER	230	208	220	492	323
NIAMEY	292	264	200	452	372
Moyenne décade	266	229	241	492	392
Moyenne décade précédente	259	226	224	490	389
Moyenne même décade 2025	286	268	282	547	401
Variation par rapport à la décade précédente (%)	2,6	1	8	0,5	0,6
Variation par rapport à la même décade en 2025(%)	-7	-15	-15	-10,0	-2,3




6. Situation pastorale

La situation pastorale à la deuxième décade d’août 2026 est caractérisée par l’enregistrement des précipitations importantes à moyennes et même nulles suivant les localités. Ces précipitations ont permis d’une part, l’amélioration du couvert végétal et d’autres part la recharge des points d’eau de surface et de la nappe phréatique, ainsi que l’écoule-

ment des koris (Aderbissinat, Tchirozérine) dans la région d’Agadez. L’alimentation des animaux est assurée par l’herbe et le pâturage aérien en régénération et par la paille résiduelle dans les localités n’ayant pas reçu de pluies, comme le cas de certaines localités de la région d’Agadez. Les intrants zootechniques (son de blé, tourteaux de coton) viennent en complémentation. Les mouvements des animaux sont en général internes guidés par la recherche du pâturage vert et de l’eau. L’état d’embonpoint du bétail s’améliore au fur et à mesure que le pâturage vert devient abondant. Les termes de l’échange sont dans l’ensemble en faveur des éleveurs.

6.1. Pâturage

La situation de pâturage est caractérisée par une amélioration progressive du couvert végétal des herbacés et ligneux. A l’exception de la région de Diffa, la bande Sud du pays est plus enherbée comparativement à la zone Nord pastorale. La strate ligneuse (Acacia raddiana, Balanites aegyptiaca, Leptadenia pyrotechnica, Salvadora persica, Maerua crassifolia, etc.) connaît un bon niveau de régénérescence et assure une part importante dans l’alimentation de bétail surtout les petits ruminants et les camelins. L’alimentation des animaux est essentiellement assurée par l’herbe verte et la paille résiduelle dans les localités n’ayant pas reçu de pluies,



Carte 1 : situation couverture végétale deuxième décade août 2026.

Cependant, comparée à la même période de l’an 2025, la campagne pastorale est nettement en retard surtout au niveau de la bande Ouest vers l’Est de Tillabéri à Diffa (voir carte 4 et photo2). Les zones pastorales des régions de Maradi, Zinder et Diffa sont plus marquées par l’écart d’installation de la campagne pastorale. C’est le cas de Bosso dans la région de Diffa où la première pluie utile est encore attendue ainsi que dans la région de Zinder en zone agropastorale (Tanout, DTK, Belbé-dji) et en zone pastorale (Nord-Est Tesker, Nord Tanout) où le développement du tapis herbacé reste toujours faible. Au niveau de la région d’Agadez, il a été observé l’existence des poches de sécheresse dans le département d’Ingall dont la situation de la bande de l’Irhazer est très inquiétante. Dans les zones agropastorales et agricoles, la situation est caractérisée par la poursuite normale du développement végétatif du tapis herbacés. Dans la bande Sud du pays, la plupart des enclaves pastorales sont colonisées par des espèces peu ou pas appréciées dont Sida cordifolia et Mitracarpus scaber. Néanmoins, au niveau de la région de Dosso, des retards de croissance sont observés dans cer-

taines localités des départements de Doutchi et Gaya consécutifs à des périodes sèches qui ont été enregistrées.



Photo 1 : Situation du pâturage sur l’enclave pastorale d’Abala dans la région de Tillabéri

En zone pastorale, la situation des pâturages connaît une amélioration du couvert végétal des herbacés et des ligneux. Cependant, on note dans la région de Tahoua, la persistance de sécheresse dans l’ensemble des départements de Tassara et Tchinta au niveau des plusieurs bandes. Les poches de sécheresse ont entraîné un flétrissement des jeunes pousses compliquant ainsi la situation du pâturage. Ainsi qu’au Nord de Tanout (Nord Tenhiya, Tanout et Gangara) et le Nord et Nord-Est et alentours de Tesker (vers Yougoum,) dans la région de Zinder ainsi que dans les communes de Foulatari et Bosso, dans la région de Diffa.



Photo 2: Aire de pâturage de Tazalit à l’Ouest de Tassara à 45 km de Tassara, région de Tahoua.

6.2 Complémentation alimentaire

Les aliments complémentaires sont disponibles sur les différents marchés

locaux du pays. Mais ils sont de plus en plus peu utilisés à cause de la présence de l’herbe verte dans les parcours. Néanmoins, l’Etat et ses partenaires continuent les opérations d’accompagnement des éleveurs à travers la vente à prix modéré et le placement des aliments pour bétail (aliments composés et son de blé) sur l’ensemble du pays. Dans la région d’Agadez, il a été placé par le Fonds FOSEL, 500 tonnes de son de blé.



Photo 3 : Mise en place par l’Etat (FOSEL) à Ingall, région d’Agadez, de son de blé pour aliment bétail.

6.3. Abreuvement des animaux

L’abreuvement des animaux se poursuit au niveau des différents points d’eaux de surface. Néanmoins, les points d’eau souterrains (puits, forage, mini AEP et stations de pompage), continuent toujours à être utilisés au niveau surtout des zones pastorales dans des localités moins arrosées ou qui disposent de peu de mares notamment dans les départements des Tassar, Tchinta et Tillia, région de Tahoua.



Photo 4: Abreuvement des animaux au niveau d’une retenue d’eau de surface, département d’Ingall, région d’Agadez.

6.4. Mouvements et concentration des animaux

A la deuxième décade d’août 2026,

les mouvements des animaux sont en général internes guidés par la recherche du pâturage vert et de l’eau. Dans la région d’Agadez on note, non seulement l’arrivée massive de transhumants à Aderbissinat qui sont installés dans les bandes où le pâturage est accessible, mais aussi la remontée à Ingall vers l’Irhaser des éleveurs transhumants au niveau de la partie possédant de pâturage. Dans la région de Zinder, des mouvements irréguliers (du Sud vers le Nord) sont observés au niveau des départements de Gouré, Magaria et Dungass. En zone agricole les fortes concentrations des animaux sont localisées dans les aires de pâturage. Dans la commune de Tagazar, région de Tillabéri, avec la présence des animaux transhumants Oudha, mais aussi des éleveurs transhumants venus du Mali identifiés dans la zone pastorale et agropastorale.



Photo 3 : Concentration des animaux dans la zone de Zouraré, région de Maradi.

6.5. Etat d’embonpoint des animaux

L’état d’embonpoint des animaux s’améliore progressivement en fonction de la disponibilité des herbes vertes et des ligneux en zone agricole et dans certaines parties de la zone pastorale. Il est bon pour les animaux au piquet et d’embouche (voir photo 8), tout comme à la décade précédente, la situation reste préoccupante au niveau de la commune rurale de Bosso, région

de Diffa où aucune pluie utile n’a encore été enregistrée. Les animaux sont très faibles et leur embonpoint se dégrade davantage surtout chez les bovins qui sont assistés pour se tenir sur pieds.



Photo 5 : Bon état d’embonpoint des ovins présentés sur le marché à bétail de Harobanda (ACNY5).


6.6. Situation sanitaire du Cheptel

La situation zoo sanitaire du cheptel est calme dans l’ensemble. Néanmoins des suspicions de foyers de pasteurellose, de Fièvre aphteuse, de dermatose nodulaire, de PPR et de maladies aviaires ont été enregistrés. Ces foyers ont été efficacement pris en charges par les services compétents sur le terrain.

6.7. Terme de l’échange

Cette semaine, le prix moyen du bouc adulte est de 38 025 FCFA, alors qu’il était de 34 700 FCFA pour la même semaine de 2025 et 30 075 FCFA pour la moyenne des 5 dernières années. Par ailleurs, le prix moyen du sac de 100 kg de mil est de 23 420 FCFA cette semaine, alors qu’il était de 25 090 FCFA pour la même semaine de 2025 et 31.915 FCFA pour la moyenne des 5 dernières années. Les termes de l’échange sont toujours en faveur de l’éleveur. Pour un bouc adulte vendu, l’éleveur peut se procurer en moyenne 162 Kg de mil. Ces termes de l’échange présentent une stabilité par rapport à la semaine passée, et des progressions de 17% par rapport à la même semaine de 2025 et de 72% comparés

à la moyenne des 5 dernières années. Cette semaine, sur 4 des 134 marchés suivis, l’éleveur doit vendre un bouc de plus d’un an pour se procurer un sac de 100 kg de mil.



VII. Phénomènes exceptionnels

Au cours de cette décade, des séquences sèches prolongées de 14 à plus de 30 jours ont été observées dans plusieurs régions du pays, notamment Diffa, Maradi et Tillabéri, avec des répercussions variables sur l'évolution des cultures.

- Dans la région de Diffa, il a été observé un déficit hydrique et vent de sable à Chétimari (Diffa). Sécheresse de plus de 30 jours à N'Guigmi et une reprise de pluie de 7,2 mm pour la commune de kabléwa mais qui n'a pas permis une bonne reprise des cultures ;
- Dans la région d'Agadez une grêle de 1 jour est tombé à Tabelot (tchirozérine) sur les cultures d'oignon, maïs, tomate et corète sur une superficie de 0,86 ha ;
- Dans la région de Maradi, le département de Dakoro a enregistré des épisodes de sécheresse affectant 15 localités réparties dans les communes d'Adjekoria, Dan Goulbi et Maiyara. A Mayahi, du 4 au 26 juillet, une séquence sèche a été signalée dans sept villages de la zone de Sarkin Aréwa, dans la commune de Maireyrey (département de Mayahi).
- Dans la région de Tillabéri, une sécheresse de 14 à 26 jours a été observée dans les communes de diagourou et la commune urbaine de Tillabéri touchant 12 villages.

Tableau n° 3 : Situation phénologique (mil et sorgho)

Régions	Levée			Levée avancée			Tallage			Montaison			Nouaison/ Epiaison			Floraison			Grenaison			Maturité		
	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S	M	S	M+S
Agadez	3	1	1	21	-	5	19	2	6	16		4			-			-			-			-
Diffa	31	49	35	30	32	30	24	1	19	6		5	1		1			-			-			-
Dosso	-	-	-	1	21	5	23	30	25	45	43	45	15	6	13	10		8	5,0		4	1,0	-	1
Maradi	-	2	1	4	7	5	10	18	13	16	64	36	25	9	18	33	-	19	11	-	6	-	-	0
Tahoua	-	-	-	8	10	9	25	36	29	33	36	34	24	16	21	7	2	5	3,0	-	2	-	-	0
Tillabéri	-	7	2	4	30	10	20	29	22	46	25	41	24	3	19	1	-	1			0			0,0
Zinder	1	2	1	5	20	12	20	32	25	26	43	33	30	2,0	18	14	-	8	4	-	2	-	-	0
Niamey			-			-	39	80	41	54	20	52	7		7	-		-			-			-
Niger	1	2	1	5	15	8	19	27	22,0	31	47	37	24	7	18	14,5	0	10	5	-	3	0,18	-	0,1

NB :M : Mil ; S : Sorgho ; M+S : Mil + Sorgho ; le Maïs tient la place du sorgho dans la région d'Agadez.

- **Commentaire** : Au cours de cette deuxième décade d'août, le stade le moins avancé est la levée pour le mil et le sorgho. La montaison constitue le stade dominant pour le mil avec 31% et pour le sorgho (47%). Le stade le plus avancé pour le mil est la maturité observée dans le département de Gaya (région de Dosso), tandis que Le stade le plus avancé du sorgho est la grenaison observée dans le département d'Illela (région de Tahoua).

Tableau n° 4 : Situation phénologique des cultures de rente (niébé et arachide)

REGIONS	Cultures	Stade le moins avancé	Stade dominant	Stade le plus avancé	Localisation
AGADECZ	Niébé	Levée avancée	Coissance/ramification	croissance/ram	Arlit et Ingall
DIFFA	Niébé	Levée	Levée	croissance/ram	Mainé soroa
	Arachide	Levée	Levée	croissance	Goudoumaria et Mainésoroa
DOSSO	Niébé	Levée	croissance/ram	fructification	Gaya et Tibiri
	Arachide	Levée	Croissance	Formation des gynophores	Dosso, Dosso.CU, Dondoutchi, Tibiri et Gaya
MARADI	Niébé	Levée avancée	croissance/ram	Maturité	Gazaoua
	Arachide	Levée	FGH	Formation des gousses	Madarounfa, Mahyahi, Gazaoua et Guidan Roudji
TAHOUA	Niébé	Levée	croissance/ram	Fructification	Illéla
	Arachide	Levée	croissance	formation des gousses	Illéla,
TILLABERI	Niébé	Levée	Croissance	Floraison	Say, Torodi, kollo, Fillingué et Balleyara
	Arachide	Levée	Croissance	FGH	Torodi
ZINDER	Niébé	Levée	croissance/ram	Maturité	Dungass, Gouré, Kantché et Magaria
	Arachide	Levée	Croissance	Formation des gousses	Dungass, Kantché, Takiéta et Magaria.
NIAMEY	Niébé	Levée avancée	croissance/ram	floraison	Arrondissements Communaux Niamey I et II
	Arachide	croissance	croissance	floraison	Arrondissements Communaux Niamey I et II
NIGER	Niébé	Levée	croissance/ram	Maturité	Maradi et Zinder
	Arachide	Levée	croissance	Formation des gousses	Maradi, Tahoua et Zinder

Commentaire

- Pour les cultures de rente, le stade le moins avancé pour le niébé et l'arachide est la levée. Le stade dominant est la croissance pour le niébé et pour l'arachide. Le stade le plus avancé pour le niébé est la maturité observée dans les régions de Maradi et Zinder. La formation des gousses de l'arachide est observée dans les régions de Maradi, Tahoua et Zinder.