

Réseau des Chambres d'Agriculture du Niger	Chambre Régionale d'Agriculture de Dosso	Chambre Régionale d'Agriculture de Tahoua
		

## Fiche technique : Maladie de la Grippe Aviaire

*Rédaction : Docteur Balkissa Seyni Issa et Omar Idi (RECA), Docteur Hamza Hamey CRA Dosso, Docteur Leila Mahaman Bassirou CRA Tahoua / 5 Août 2023*

### 1) Que peut-on dire de la maladie de la grippe aviaire au Niger ?



La maladie de la grippe aviaire, ou influenza aviaire, constitue une menace pour les éleveurs de volaille. Cette maladie est apparue au Niger en 2006. Depuis, elle réapparaît plus ou moins régulièrement. Ainsi, en début 2022, une épizootie a sévi dans les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri, et a causé la mort de 90 000 sujets de volaille. En décembre 2022, des foyers de la maladie ont été identifiés dans la Région de Tahoua et à Niamey

et environ 10 000 volailles ont dû être abattues.

La grippe aviaire peut atteindre de nombreux oiseaux domestiques et sauvages. **C'est une maladie très contagieuse**, une fois que la maladie apparaît dans votre élevage il est trop tard pour agir. Il existe des mesures à prendre pour prévenir cette maladie. Elle est également une zoonose c'est-à-dire une maladie touchant les animaux mais pouvant contaminer l'homme dans certaines situations.

### 2) Comment reconnaître la maladie de la grippe aviaire ?

- Les volailles (adultes ou poussins) sont fatiguées, bougent moins ou restent en prostration (c'est-à-dire sont couchées sur le côté et n'arrivent pas à se tenir debout) et on constate également une perte d'appétit ;
- Elles respirent difficilement, présentent un écoulement des narines, toussent et éternuent constamment ;
- Elles ont une crête et des pattes gonflées et congestionnées (afflux du sang), plumes hérissées ;
- Elles font de la diarrhée et on note également une chute brutale de ponte et anomalies des œufs (ponte de nombreux œufs à coquille molle ou sans coquille) ;
- Et la mort subite peut survenir (mortalité souvent très élevée).

### 3) Comment les volailles attrapent-elles cette maladie ?

Le virus se transmet d'un oiseau malade à un autre oiseau sain par contact direct. Le virus peut être transporté par des oiseaux sauvages, par des volailles qui viennent d'élevages contaminés, par les hommes ou les outils, et aussi par le vent et les poussières.

La maladie de la grippe aviaire est due à un virus, c'est à dire **qu'il n'existe aucun traitement contre cette maladie** une fois les volailles atteintes.

#### 4) La maladie de la grippe aviaire est-elle transmissible à l'homme ?

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que le risque de transmission à l'homme des virus influenza aviaries à potentiel zoonotique qui circulent à l'heure actuelle est faible. Il n'y a pas de risques de contamination si la volaille ou les œufs sont bien cuits. Des précautions doivent être prises en cas de mortalité dans un élevage et une protection (gants, masque) est nécessaire pour manipuler les animaux malades.

#### 5) Comment prévenir (éviter) cette maladie ?

Pour se protéger contre la maladie de la grippe aviaire, il faut mettre en place des gestes barrières :

- Ne pas introduire des volailles venant d'ailleurs ou les mettre en quarantaine avant l'introduction dans le poulailler ;
- Ne pas tuer et préparer des volailles à proximité de son élevage et toujours prendre en compte le sens du vent pour éviter que celui-ci aille vers l'élevage ;
- Eviter ou empêcher que les oiseaux sauvages soient en contact direct avec les volailles, l'eau et la nourriture ;
- Ne pas laisser des personnes visiter votre élevage ou venir à proximité, il faut empêcher également le contact des volailles avec des personnes ou des enfants ;
- Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon surtout après avoir touché des oiseaux ;
- S'assurer que toute personne ayant touché des oiseaux morts se lave les mains au savon ;
- Laver les vêtements, les chaussures, les véhicules et les cages à l'aide de savon ou de désinfectant ;
- Bruler et enterrer les oiseaux morts ou infectés à 2 mètres de profondeur et il faut porter des gants et un masque.

Signaler toute maladie inhabituelle ou décès parmi les volailles, les oiseaux sauvages et d'autres animaux, **à l'agent de l'élevage de votre localité ou le plus proche** qui informera les autorités compétentes.



Quelques signes cliniques de la maladie de Grippe Aviaire

**Enabel** 



*Le RECA bénéficie du financement du Projet REEL Mahita (Enabel) et du Programme de Renforcement de la Résilience des Systèmes Alimentaires en Afrique de l'Ouest (FSRP / Banque mondiale).*